

Czytaj

[« poprzedni](#) | [następny »](#)

Gdy refluks prowadzi do raka – przełyk Barretta

 Tagi: [choroba refluksowa](#), [diagnostyka](#), [leczenie](#), [nowotwór](#), [przełyk](#), [rak](#), [refluks](#), [zgaga](#)

Przełyk Barretta to stan przednowotworowy przełyku. Stanowi stadium pośrednie między chorobą refluksową i zapaleniem śluzówki przełyku, a rakiem przełyku. Zaczyna się niepozornie i długo nie daje żadnych objawów. Co powinniśmy wiedzieć o przełyku Barretta?

Problemy z refluksiem?

To może być okrężnica. Sprawdź jak Colonex może Ci pomóc!
www.drnaturopa-oczyszczanie.pl

Zespół Jelita Drażliwego

Skuteczny i naturalny sposób na IBS
 Poznaj właściwości miodu Manuka
www.miodymanuka.pl

Reklamy Google

Kiedy zareagować?

Dolegliwości związanych z refluksiem nie wolno lekceważyć. Uporczywe, powtarzające się ataki zgagi powinny skłonić do wizyty u specjalisty. – Sygnałem alarmowym świadczącym, że z przełykiem dzieje się coś złego powinny być zaburzenia w przelykaniu pokarmów stałych i płynnych oraz **wymioty z krwią** – dodaje dr Anita Gašiorowska. – Objawy tego typu świadczą, że prawdopodobnie cierpimy na przełyk Barretta. Jeśli natomiast do tych objawów dochodzi jeszcze chudnięcie to znak, że w naszym ciele rozwija się już [choroba](#) nowotworowa.


 Zobacz też: [Jak rozpoznać chorobę refluksową przełyku?](#)

Jak można rozpoznać przełyk Barretta?

Zdiagnozowanie przełyku Barretta wymaga przeprowadzenia zabiegu **endoskopii** górnego [odcinka](#) układu pokarmowego. Tkanka zmieniona chorobowo przyjmuje inny kolor podczas badania, co ułatwia wykonanie **biopsji**, czyli pobranie wycinka tkanki do oceny histopatologicznej. Rozwijający się w przełyku stan zapalny doprowadza do powstania **blizn** i zastąpienia normalnego nabłonka płaskiego, nabłonkiem cylindrycznym. Obecność komórek jelitowych w przełyku (**metaplazja jelitowa**) potwierdza istnienie przełyku Barretta. U pacjentów z tym schorzeniem zagrożenie rakiem przełyku jest kilkadziesiąt razy wyższe niż u osób [zdrowych](#). – Każdy pacjent z przełykiem Barretta ma 1% szans rocznie na zachorowanie na **raka przełyku**. Zatem "Barrett" nieleczony przez 30 lat sprawia, że mamy 30% szans na [rozwój](#) nowotworu – przestrzega dr n. med. Wojciech Dąbrowski, chirurg z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Informacja prasowa: HAMMERMED

[« Poprzednia strona](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#)

Artykuł z dnia: 2011-11-07

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

[Zadaj pytanie ekspertowi na forum medycznym Commed.pl](#)

 Liczba porad w serwisie: **1 4 1 2 8 9**

[LOGOWANIE](#) | [REJESTRACJA](#)

Niezbędnik >>



Rynek medyczny.pl

w placówkach | w aptekach

Szukaj wśród 221 742 oddziałów lub poradni



Problemy z wypróżnianiem

- Raz zaparcie, raz biegunka – czyli objawy zespołu jelita drażliwego
- Biegunka – objawy i leczenie
- Jak objawia się zespół jelita drażliwego?
- Domowe sposoby na biegunkę



Rozmowy o zdrowiu >>

- Czym jest tapping?
- Jak tapping oddziałuje na emocje?
- Czy negatywne emocje mogą powodować choroby?
- Powrót do normalności, czyli wolontariat w hospicjum
- Oswajanie śmierci, czyli życie w hospicjum okiem psychologa
- Na czym polega kwasowa erozja szkliwa?
- O umieraniu – kiedy milczenie jest skarbem
- Profilaktyka i leczenie raka prostaty
- Lipoliza – na czym polega zabieg?
- Lipoliza iniekcyjna – zamiast liposukcji?
- Gorączka neutropeniczna